

【前立腺】DOC (DTX) + PSL療法

1クルールの期間：21日

| | 薬品名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 |
|----|------------------|------------------------------|------|---------|
| ① | デキサート 生食 | 6.6mg 100mL | 30分 | day1 |
| ② | ドセタキセル 5%ブドウ糖 | 70mg/m ² 250mL | 60分 | |
| ③ | 生食 | 50mL | 5分 | |
| 内服 | プレドニン | 10mg/日 | 朝昼食後 | day1-連日 |

【腎】Avelumab + Axitinib療法

1クルールの期間：14日

| | 薬品名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 |
|----|-------------|------------------|------|---------|
| ① | ポララミン | 5mg | iv | day1 |
| ② | アセリオ | 500mg | 15分 | |
| ③ | 生食 | 50mL | 15分 | |
| ④ | バベンチオ 生食 | 10mg/kg 250mL | 60分 | |
| ⑤ | 生食 | 50mL | 5分 | |
| 内服 | インライタ | 10mg/日 | 朝夕食後 | day1-連日 |

【腎】オプジーボ（ニボルマブ）療法

1クルールの期間：14日

| | 薬品名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 |
|---|-------------|----------------|------|------|
| ① | オプジーボ 生食 | 240mg 100mL | 30分 | day1 |
| ② | 生食 | 50mL | 5分 | |

【尿路上皮】GEM+CDDP（GC）療法

1クールの間：28日

day1、8、15

| | 薬品名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 |
|---|--------|-----------------------|------|-----------|
| ① | デキサート | 6.6mg | 30分 | day1、8、15 |
| | 生食 | 100mL | | |
| ② | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 30分 | |
| | 生食 | 100mL | | |
| ③ | 生食 | 50mL | 5分 | |

day2

| | 薬品名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 |
|---|-------------|---------------------|----------|------|
| A | ソルラクト | 2000mL | 24時間持続 | day2 |
| ① | 生食 | 500mL | 60分（側管） | |
| | 硫酸Mg1mEq/mL | 8mL | | |
| ② | 生食 | 500mL | 90分（側管） | |
| ③ | パロノセトロン | 0.75mg | 30分（側管） | |
| | デキサート | 9.9mg | | |
| ④ | シスプラチン | 70mg/m ² | 120分（側管） | |
| | 生食 | 全量500mL | | |
| ⑤ | フロセミド | 20mg | iv（側管） | |

day2-4アプレピタント内服、day3-5デカドロン内服

【尿路上皮】Avelumab維持療法

1クールの間：14日

| | 薬品名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 |
|---|-------|---------|------|------|
| ① | ポララミン | 5mg | iv | day1 |
| ② | アセリオ | 500mg | 15分 | |
| ③ | 生食 | 50mL | 15分 | |
| ④ | バベンチオ | 10mg/kg | 60分 | |
| | 生食 | 250mL | | |
| ⑤ | 生食 | 50mL | 5分 | |