

【食道】 weekly PTX療法

1 クールの期間：49日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	デキサート	6.6mg	15分	day1、8、15、22、 29、36
	ファモチジン	20mg		
	ポララミン	5mg		
	生食	50mL		
②	生食	100mL	15分	
③	タキソール	100mg/m ²	60分	
	5%ブドウ糖	250mL		
④	生食	50mL	5分	

【食道】 DOC (DTX) 療法

1 クールの期間：21日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	グラニセトロン	1mg	15分	day1
	デキサート	6.6mg		
②	ドセタキセル	70mg/m ²	90分	
	5%ブドウ糖	250mL		
③	生食	50mL	5分	

【食道】 DCF療法

1 クールの期間：21日（術前化学療法）

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
A	フルオロウラシル	750mg/m ²	24時間持続	day1-5
	ソルアセトF	500mL		
①	生食	500mL	120分（側管）	day1
	硫酸Mg1mEq/mL	8mL		
②	生食	500mL	120分（側管）	
③	パロノセトロン	0.75mg	15分（側管）	day1
	デキサート	9.9mg (6.6mg)		day1・day2-5
④	ドセタキセル	70mg/m ²	60分（側管）	day1
	5%ブドウ糖	250mL		
⑤	生食	50mL	5分（側管）	
⑥	シスプラチン	70mg/m ²	120分（側管）	
	生食	500mL		
⑦	フロセミド	20mg	iv（側管）	
⑧	生食	1000mL	240分（側管）	
⑨	ソルラクト	500mL	90分（側管）	day2-5

day1-3アプレピタント内服

【食道】FP療法

1クールの間：28日（進行・再発）

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
A	フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間持続	day1-5
	ソルアセトF	500mL		
①	生食	500mL	120分（側管）	day1
	硫酸Mg1mEq/mL	8mL		
②	生食	500mL	120分（側管）	
③	パロノセトロン	0.75mg	15分（側管）	day1
	デキサート	9.9mg（6.6mg）		day1・day2-5
④	シスプラチン	80mg/m ²	120分（側管）	day1
	生食	500mL		
⑤	フロセミド	20mg	iv（側管）	
⑥	生食	1000mL	240分（側管）	
⑦	ソルラクト	500mL	90分（側管）	

day1-3アプレピタント内服

【食道】オプジーボ（ニボルマブ）療法

1クールの間：14日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	オプジーボ	240mg	30分	day1
	生食	100mL		
②	生食	50mL	5分	

【食道】キイトルーダ療法

1クールの間：21日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	キイトルーダ	200mg	30分	day1
	生食	100mL		
②	生食	50mL	5分	

2022.4.4