

【胆】GEM療法

1クールの間：28日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	グラニセトロン デキサート	1mg 6.6mg	15分	day1、8、15
②	ゲムシタビン 生食	1000mg/m ² 100mL	30分	
③	生食	50mL	5分	

【胆】GC (GEM+CDDP) 療法

1クールの間：21日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	生食 硫酸Mg1mEq/mL	500mL 8mL	90分	day1、8
②	生食	500mL	90分	
③	グラニセトロン デキサート	1mg 6.6mg	15分	
④	シスプラチン 生食	25mg/m ² 250mL	60分	
⑤	ゲムシタビン 生食	1000mg/m ² 100mL	30分	
⑥	生食	50mL	5分	

【胆】GS (GEM+S-1) 療法

1クールの間：21日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	グラニセトロン デキサート	1mg 6.6mg	15分	day1、8
②	ゲムシタビン 生食	1000mg/m ² 100mL	30分	
③	生食	50mL	5分	
内服	S-1	60~100mg/日	朝夕食後	day1夕-day15朝

【胆】 GCS (GEM+CDDP+S-1) 療法

1 クールの期間：14日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	生食	500mL	90分	day1
	硫酸Mg1mEq/mL	8mL		
②	生食	500mL	90分	
③	グラニセトロン	1mg	15分	
	デキサート	6.6mg		
④	シスプラチン	25mg/m ²	60分	
	生食	250mL		
⑤	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	
	生食	100mL		
⑥	生食	50mL	5分	
内服	S-1	80~120mg/日	朝夕食後	day1夕-day8朝

【肝】 Atezolizumab+Bmab療法

1 クールの期間：21日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	生食	50mL	5分	day1
②	テセントリク	1200mg	60→30分	
	生食	250mL		
③	生食	50mL	5分	
④	ベバシズマブ	15mg/kg	90→60→30分	
	生食	100mL		
⑤	生食	50mL	5分	

2022.4.4