

【睥】 GEM療法

1 クールの期間：28日

| | 薬品名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 |
|---|------------------|--------------------------------|------|-----------|
| ① | グラニセトロン デキサート | 1mg 6.6mg | 15分 | day1、8、15 |
| ② | ゲムシタビン 生食 | 1000mg/m ² 100mL | 30分 | |
| ③ | 生食 | 50mL | 5分 | |

【睥】 GEM+nab-PTX療法

1 クールの期間：28日

| | 薬品名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 |
|---|------------------|--------------------------------|------|-----------|
| ① | パロノセトロン デキサート | 0.75mg 6.6mg | 15分 | day1、8、15 |
| ② | 生食 | 50mL | 5分 | |
| ③ | アブラキサン 生食 | 125mg/m ² 適宜 | 30分 | |
| ④ | 生食 | 50mL | 5分 | |
| ⑤ | ゲムシタビン 生食 | 1000mg/m ² 100mL | 30分 | |
| ⑥ | 生食 | 50mL | 5分 | |

【睥】 nal-IRI+5FU/I-LV療法

1 クールの期間：14日

| | 薬品名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 |
|---|--------------------|----------------------------------|---------------------|--------|
| ① | パロノセトロン デキサート | 0.75mg 6.6mg | 15分 | day1 |
| ② | オニバイド 生食 | 70mg/m ² 500mL | 90分 | |
| ③ | 生食 | 50mL | 5分 | |
| ④ | レボホリナート 5%ブドウ糖 | 200mg/m ² 250mL | 120分 | |
| ⑤ | 生食 | 50mL | 5分 | |
| ⑥ | フルオロウラシル 5%ブドウ糖 | 2400mg/m ² 全量230mL | 46時間 インフューザ -ポンプ | day1-3 |

【痔】GS (GEM+S-1) 療法 (術前化学療法)

1 クールの期間：21日

| | 薬品名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 |
|----|------------------|--------------------------------|------|--------------|
| ① | グラニセトロン デキサート | 1mg 6.6mg | 15分 | day1、8 |
| ② | ゲムシタビン 生食 | 1000mg/m ² 100mL | 30分 | |
| ③ | 生食 | 50mL | 5分 | |
| 内服 | S-1 | 80~120mg/日 | 朝夕食後 | day1夕-day15朝 |

2023.3.1