

【睥】 GEM療法

1 クールの期間：28日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	グラニセトロン デキサート	1mg 6.6mg	15分	day1、8、15
②	ゲムシタビン 生食	1000mg/m ² 100mL	30分	
③	生食	50mL	5分	

【睥】 GEM+nab-PTX療法

1 クールの期間：28日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	パロノセトロン デキサート	0.75mg 6.6mg	15分	day1、8、15
②	生食	50mL	5分	
③	アブラキサン 生食	125mg/m ² 適宜	30分	
④	生食	50mL	5分	
⑤	ゲムシタビン 生食	1000mg/m ² 100mL	30分	
⑥	生食	50mL	5分	

【睥】 nal-IRI+5FU/I-LV療法

1 クールの期間：14日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	パロノセトロン デキサート	0.75mg 6.6mg	15分	day1
②	オニバイド 生食	70mg/m ² 500mL	90分	
③	生食	50mL	5分	
④	レボホリナート 5%ブドウ糖	200mg/m ² 250mL	120分	
⑤	生食	50mL	5分	
⑥	フルオロウラシル 5%ブドウ糖	2400mg/m ² 全量230mL	46時間 インフューザ -ポンプ	day1-3