

【大腸】mFOLFOX6療法

1クルールの期間：14日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	グラニセトロン デキサート	1 mg 6.6mg	15分	day1
②	レボホリナート 5%ブドウ糖	200mg/m ² 250mL	120分 同時に	
③	オキサリプラチン 5%ブドウ糖	85mg/m ² 250mL		
④	フルオロウラシル 生食	400mg/m ² 50mL	全開	
⑤	生食	50mL	5分	
⑥	フルオロウラシル 5%ブドウ糖	2400mg/m ² 全量230mL	46時間 インフューザ [®] -ホ [®] ン [®]	day1-3

【大腸】mFOLFOX6+Bmab療法

1クルールの期間：14日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	グラニセトロン デキサート	1 mg 6.6mg	15分	day1
②	ベバシズマブ 生食	5mg/kg 100mL	90→60→30分	
③	生食	50mL	5分	
④	レボホリナート 5%ブドウ糖	200mg/m ² 250mL	120分 同時に	
⑤	オキサリプラチン 5%ブドウ糖	85mg/m ² 250mL		
⑥	フルオロウラシル 生食	400mg/m ² 50mL	全開	
⑦	生食	50mL	5分	
⑧	フルオロウラシル 5%ブドウ糖	2400mg/m ² 全量230mL	46時間 インフューザ [®] -ホ [®] ン [®]	day1-3

【大腸】 mFOLFOX6+Pmab療法

1クルルの期間：14日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	グラニセトロン デキサート	1 mg 6.6mg	15分	day1
②	ベクティビックス 生食	6mg/kg 100mL	60分	
③	生食	50mL	5分	
④	レボホリナート 5%ブドウ糖	200mg/m ² 250mL	120分 同時に	
⑤	オキサリプラチン 5%ブドウ糖	85mg/m ² 250mL		
⑥	フルオロウラシル 生食	400mg/m ² 50mL	全開	
⑦	生食	50mL	5分	
⑧	フルオロウラシル 5%ブドウ糖	2400mg/m ² 全量230mL	46時間 インフューザ [®] ホン [®]	day1-3

【大腸】 XELOX (CAPOX) 療法

1クルルの期間：21日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	グラニセトロン デキサート	1 mg 6.6mg	15分	day1
②	オキサリプラチン 5%ブドウ糖	130mg/m ² 500mL	120分	
③	生食	100mL	15分	
内服	カペシタビン	2000mg/m ² /日	朝夕食後	day1夕-day15朝

【大腸】 XELOX (CAPOX) +Bmab療法

1クルルの期間：21日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	グラニセトロン デキサート	1 mg 6.6mg	15分	day1
②	ベバシズマブ 生食	7.5mg/kg 100mL	90→60→30分	
③	生食	50mL	5分	
④	オキサリプラチン 5%ブドウ糖	130mg/m ² 500mL	120分	
⑤	生食	100mL	15分	
内服	カペシタビン	2000mg/m ² /日	朝夕食後	day1夕-day15朝

【大腸】CAPIRI (XELIRI) +Bmab療法

1クルの期間：21日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	パロノセトロン デキサート	0.75mg 6.6mg	15分	day1
②	ベバシズマブ 生食	7.5mg/kg 100mL	90→60→30分	
③	イリノテカン 5%ブドウ糖	200mg/m ² 250mL	60分	
④	生食	50mL	5分	
内服	カペシタビン	1600mg/m ² /日	朝夕食後	day1夕-day15朝

【大腸】FOLFIRI療法

1クルの期間：14日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	グラニセトロン デキサート	1 mg 6.6mg	15分	day1
②	レボホリナート 5%ブドウ糖	200mg/m ² 250mL	120分	
③	イリノテカン 5%ブドウ糖	150mg/m ² 250mL	90分 ②と同時に	
④	フルオロウラシル 生食	400mg/m ² 50mL	全開	
⑤	生食	50mL	5分	
⑥	フルオロウラシル 5%ブドウ糖	2400mg/m ² 全量230mL	46時間 インフューザ [®] -ホ [®] ン [®]	day1-3

【大腸】 FOLFIRI+Bmab療法

1クルルの期間：14日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	グラニセトロン デキサート	1 mg 6.6mg	15分	day1
②	ベバシズマブ 生食	5mg/kg 100mL	90→60→30分	
③	生食	50mL	5分	
④	レボホリナート 5%ブドウ糖	200mg/m ² 250mL	120分	
⑤	イリノテカン 5%ブドウ糖	150mg/m ² 250mL	90分 ④と同時に	
⑥	フルオロウラシル 生食	400mg/m ² 50mL	全開	
⑦	生食	50mL	5分	
⑧	フルオロウラシル 5%ブドウ糖	2400mg/m ² 全量230mL	46時間 インフューザーホップ	day1-3

【大腸】 FOLFIRI+Pmab療法

1クルルの期間：14日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	グラニセトロン デキサート	1 mg 6.6mg	15分	day1
②	ベクティビックス 生食	6mg/kg 100mL	60分	
③	生食	50mL	5分	
④	レボホリナート 5%ブドウ糖	200mg/m ² 250mL	120分	
⑤	イリノテカン 5%ブドウ糖	150mg/m ² 250mL	90分 ④と同時に	
⑥	フルオロウラシル 生食	400mg/m ² 50mL	全開	
⑦	生食	50mL	5分	
⑧	フルオロウラシル 5%ブドウ糖	2400mg/m ² 全量230mL	46時間 インフューザーホップ	day1-3

【大腸】 FOLFIRI+RAM療法

1クルルの期間：14日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	グラニセトロン	1 mg	15分	day1
	デキサート ポララミン	6.6mg 5mg		
②	サイラムザ	8mg/kg	60分→30分	
	生食	250mL		
③	生食	100mL	60分→10分	
④	レボホリナート	200mg/m ²	120分	
	5%ブドウ糖	250mL		
⑤	イリノテカン	150mg/m ²	90分 ④と同時に	
	5%ブドウ糖	250mL		
⑥	フルオロウラシル	400mg/m ²	全開	
	生食	50mL		
⑦	生食	50mL	5分	
⑧	フルオロウラシル 5%ブドウ糖	2400mg/m ² 全量230mL	46時間 インフューザーポンプ	day1-3

【大腸】 FOLFOXIRI+Bmab療法

1クルルの期間：14日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	パロノセトロン	0.75mg	15分	day1
	デキサート	9.9mg		
②	ベバシズマブ	5mg/kg	90→60→30分	
	生食	100mL		
③	生食	50mL	5分	
④	イリノテカン	150mg/m ²	60分	
	5%ブドウ糖	250mL		
⑤	レボホリナート	200mg/m ²	120分	
	5%ブドウ糖	250mL		
⑥	オキサリプラチン	85mg/m ²	同時に	
	5%ブドウ糖	250mL		
⑦	生食	50mL	5分	
⑧	フルオロウラシル 5%ブドウ糖	2400mg/m ² 全量230mL	46時間 インフューザーポンプ	day1-3

day1-3アプレピタント、day2-4デカドロン内服

【大腸】SOX療法

1クルルの期間：21日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	グラニセトロン デキサート	1 mg 6.6mg	15分	day1
②	オキサリプラチン 5%ブドウ糖	130mg/m ² 500mL	120分	
③	生食	100mL	15分	
内服	S-1	80~120mg/日	朝夕食後	day1夕-day15朝

【大腸】SOX+Bmab療法

1クルルの期間：21日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	グラニセトロン デキサート	1 mg 6.6mg	15分	day1
②	ベバシズマブ 生食	7.5mg/kg 100mL	90→60→30分	
③	生食	50mL	5分	
④	オキサリプラチン 5%ブドウ糖	130mg/m ² 500mL	120分	
⑤	生食	100mL	15分	
内服	S-1	80~120mg/日	朝夕食後	day1夕-day15朝

【大腸】CPT-11療法

1クルルの期間：14日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	グラニセトロン デキサート	1mg 6.6mg	15分	day1
②	イリノテカン 5%ブドウ糖	150mg/m ² 250mL	90分	
③	生食	50mL	5分	

【大腸】CPT-11+Pmab療法

1クルルの期間：14日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	グラニセトロン デキサート	1mg 6.6mg	15分	day1
②	ベクティビックス 生食	6mg/kg 100mL	60分	
③	生食	50mL	5分	
④	イリノテカン 5%ブドウ糖	150mg/m ² 250mL	90分	
⑤	生食	50mL	5分	

【大腸】IRIS療法

1クルルの期間：28日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	グラニセトロン	1 mg	15分	day1、15
	デキサート	6.6mg		
②	イリノテカン	125mg/m ²	90分	
	5%ブドウ糖	250mL		
③	生食	50mL	5分	
内服	S-1	80~120mg/日	朝夕食後	day1夕-day15朝

【大腸】IRIS+Bmab療法

1クルルの期間：28日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	グラニセトロン	1 mg	15分	day1、15
	デキサート	6.6mg		
②	ベバシズマブ	5mg/kg	90→60→30分	
	生食	100mL		
③	イリノテカン	100mg/m ²	90分	
	5%ブドウ糖	250mL		
④	生食	50mL	5分	
内服	S-1	80~120mg/日	朝夕食後	day1夕-day15朝

【大腸】Pmab療法

1クルルの期間：14日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	ベクティビックス	6mg/kg	60分	day1
	生食	100mL		
②	生食	50mL	5分	

【大腸】オプジーボ（ニボルマブ）療法

1クルルの期間：14日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	オプジーボ	240mg	30分	day1
	生食	100mL		
②	生食	50mL	5分	

【大腸】キイトルーダ療法

1クルルの期間：21日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	キイトルーダ	200mg	30分	day1
	生食	100mL		
②	生食	50mL	5分	

【大腸】 Cmab療法

1クルールの期間：7日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	ポララミン	1 mg	30分	day1
	ファモチジン	20mg		
	デキサート	6.6mg		
	生食	50mL		
②	アービタックス 生食 (初回)	400mg/m ² 全量500mL	120分	day1
②'	アービタックス 生食 (2回目以降)	250mg/m ² 全量250mL	60分	
③	生食	250mL	60分	

【大腸】 Enco+Bini+Cmab

1クルールの期間：7日

	薬品名	投与量	投与時間	投与日
①	ポララミン	1 mg	30分	day1
	ファモチジン	20mg		
	デキサート	6.6mg		
	生食	50mL		
②	アービタックス 生食 (初回)	400mg/m ² 全量500mL	120分	day1
②'	アービタックス 生食 (2回目以降)	250mg/m ² 全量250mL	60分	
③	生食	250mL	60分	
内服	ビラフトビ	300mg/日	1日1回	day1-連日
	メクトビ	90mg/日	1日2回朝夕	day1夕-連日